



Das Demenzsyndrom



Hypothesen zur Entstehung von BPSD




85 % aller Alzheimer Patienten haben neuropsychiatrische Störungen²⁾:

● Apathie ²⁾	72 %
● Agitation ¹⁾ :	60 %
● Ängstlichkeit ²⁾ :	48 %
● Depression ¹⁾⁺²⁾ :	42-50 %
● Aggression/Agitation ¹⁾⁺²⁾ :	25-34 %
● Labilität, Irritation ²⁾ :	36 %
● gestörte Psychomotorik ²⁾ :	38 %
● Wahnvorstellungen ²⁾ :	20 %
● Gewalttätigkeit ¹⁾ :	<20 %
● Abnormes Sexualverhalten ¹⁾ :	<10 %

1.) Gauthier (1996), 2.) Cummings (1996, 1997)

Symptombereiche des typischen AD-Verlaufes



Gauthier et al (1996), Kertesz and Mohs (1996), Gelinas and Auer (1996), Eastwood and Reisberg (1996), Barclay et al (1985)

Verhaltensstörungen bei Demenz

Medizinische Ursachen

- Infektion
- Schmerz
- Delir
- etc.

Andere mögliche Auslöser

- Hunger
- Harndrang
- Stuhldrang
- Einschränkungen
- „falsche Reaktion“
- Betreuerüberlastung
- etc.

Sozialmedizinische Bedeutung der BPSD

- stehen für Angehörige und Pflegende oft im Vordergrund
- Hauptbelastungsfaktor
- häufigster Anlass für vorzeitige Heimunterbringung
